EXS™
ESTD. 1993

INSTRUCTIONS FOR CONDOM USE

LTC HEALTHCARE
ESTD. 1993

DISTRIBUTED BY:
LTC Healthcare
The Old Station Yard, Milby Road
Boroughbridge, YO51 9BL
Tel: 0044 (0) 1423 326687
Email: info@ltchealthcare.co.uk
www.ltchealthcare.co.uk
@exscondomsofficial

MANUFACTURED BY:
EX INTERNACIONAL, S.A.
C/Canigó, 6 - LLerona, 08520 Les Franqueses del Vallés,
(Barcelona) SPAIN





MD
ISO 4074

CE
0318

Read the Instructions for use

Przeczytaj instrukcję użytkowania
Läs bruksanvisningen
Lea las instrucciones de uso
Lees de gebruiksaanwijzing
Lesen Sie die Gebrauchsanweisungt
Přečtěte si návod k použití
Leggi le istruzioni per l'uso
Les bruksanvisningen
Læs brugsanvisningen
Lire les instructions d'utilisation
Leia as instruções de uso
اقرأ تعليمات الاستخدام
Lugege kasutusjuhendit
Lugege kasutusjuhendit

Not to Be used If Package is damaged

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
Får inte användas om förpackningen är skadad
No debe usarse si el paquete está dañado
Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
Nepoužívat, pokud je obal poškozen
Da non utilizzare se la confezione è danneggiata
Må ikke brukes hvis pakken er skadet
Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
Não deve ser usado se o pacote estiver danificado
لا تستخدم في حالة تلف العبوة
Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud
Nenaudoti, jei pakuotė pažeista

LATEX

Caution this product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions including anaphylactic shock.

Uwaga: Ten produkt zawiera lateks kauczuku naturalnego, który może powodować reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny.

Varning: Denna produkt innehåller naturgummilatex som kan orsaka allergiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock.

Precaución: este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas, incluido el shock anafiláctico.

Let op: Dit product bevat natuurlijke rubberlatex die allergische reacties kan veroorzaken, waaronder anafylactische shock.

Warnung: Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, der allergische Reaktionen bis hin zu anaphylaktischem Schock auslösen

Upozornění: Tento produkt obsahuje přírodní latex, který může způsobit alergické reakce včetně anafylaktického šoku.

Avvertenza: questo prodotto contiene lattice naturale, che può causare reazioni allergiche incluso shock anafilattico.

Forsiktig: Dette produktet inneholder naturgummilateks som kan forårsake allergiske reaksjoner inkludert anafylaktisk sjokk.

Forsigtig: Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner, herunder anafylaktisk shock.

Attention : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques, notamment un choc

Atenção este produto contém látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas incluindo choque anafilático

Ettevaatust: see toode sisaldab looduslikku kummilateksit, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone, sealhulgas anafülaktilist šokki.

Įspėjimas: Šiame gaminyje yra natūralaus latekso, kuris gali sukelti alergines reakcijas, įskaitant anafilaksinį šoką.

تحذير: يحتوي هذا المنتج على مادة اللاتكس الطبيعي ، والتي قد تسبب تفاعلات تحسسية ، بما في ذلك صدمة الحساسية.

Do not expose to sunlight
Utsätt inte för solljus
No exponer a la luz solar
Niet blootstellen aan zonlicht
Nicht dem Sonnenlicht aussetzen
Nevystavujte slunečnímu záření
Nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych
Non esporre alla luce solare
Må ikke utsettes for sollys
Må ikke udsættes for sollys
Ne pas exposer au soleil
Não exponha à luz solar
لا تعرض لأشعة الشمس
Ärge jätke päikesevalguse kätte
Nelaikykite saulės spindulių

Keep Dry
Utrzymuj produkt w suchości!
Håll produkten torr
Mantenga el producto seco
Houd het product droog
Produkt trocken halten
Udržujte výrobek v suchu
Mantieni il prodotto asciutto
Hold produktet tørt
Gardez le produit au sec
Mantenha o produto seco
أبق المنتج على جاف
Hoida kuivas
Laikykite produktą sausą

30°C
5°C

Storage Temperature
Temperatura przechowywania
Förvaringstemperatur
Temperatura de almacenamiento
Bewaar temperatuurt
Lagertemperatur
Skladovací teplota
Temperatura di conservazione
Lager temperatur
Lager temperatur
Température de stockage
Temperatura de armazenamento
درجة حرارة التخزين
Säilitustemperatuur
Laikymo temperatūra

Use Once
Użyj raz
Använd en gång
Usar una vez
Een keer gebruiken
Einmal verwenden
Použijte jednou
Utilizzare una volta
Bruk en gangt
Brug én gang
Utiliser une fois
Usar uma vez
استخدم مرة واحدة
Kasutage üks kord
Naudokite vieną kartą

Revision No. EXS/05.08.2022

UK

INSTRUCTIONS FOR CONDOM USE

1. Check the date on the condom foil to ensure the condom is within the expiry date usually printed on the back of the foil. Tear along one side of the condom foil making sure you do not damage the condom with finger nails or jewellery. If the condom foil is damaged discard that condom and use a new one from an undamaged pack.
2. If you are using a lubricant only use a water based lubricant such as EXS™ or Boys Own™ do not use oil based lubricants such as petroleum jelly as these may damage the condom.
3. Hold the condom teat between your finger and thumb and roll the condom onto an erect penis before contact with your partner. Unroll down the full length of the penis expelling any air from the condom.
4. Latex condoms are intended to prevent pregnancy, HIV/AIDS, and other sexually transmitted infection but do not completely eliminate the risks of pregnancy and STIs. Latex condoms are most effective against STIs such as HIV infection (AIDS) and gonorrhea that are spread by contact with the head of the penis. Latex condoms are less effective against STIs such as Human Papillomavirus (HPV) and herpes. These STIs can also be spread by contact with infected skin that is not covered by the condom. Latex condoms reduce the risk of transmitting STIs by providing a barrier against the source of the infection. If you believe you have an STI, contact a health care provider. Latex condoms are to assist in prevention of sexually transmitted infections and pregnancy. For more information on latex condoms or STIs, contact a health care provider or a public health agency.
5. If you feel the condom is slipping off, or is tightening excessively then withdraw the penis from your partner and check the condom is in place and not damaged. If the condom has moved then roll it back in place or use another condom if you are concerned about the condom being damaged. If the rubber material is sticky or brittle or obviously damaged, do not use the condom. If the colour is uneven or changed, do not use the condom. Condoms are made of natural rubber latex which may cause allergic reactions including anaphylactic shock if the user allergic to latex.
6. After ejaculation withdraw the penis from your partner holding the base of the condom to ensure it does not slip off. When the penis is withdrawn from your partner you can then remove the condom.
7. If you are concerned the condom has been damaged during sex then seek medical assistance such as a Doctor or Sexual Healthcare advisor preferably within 24 hours, but not later than 72 hours. If the condom foil is damaged discard that condom and choose another condom from the pack. Consult a doctor or pharmacist about the compatibility of topical medicines that might come in contact with the condom.
8. Use a condom only once. Re-use of a condom may increase the risk of breakage, slippage, transmission of sexually transmitted infections including HIV. Dispose of the condom by wrapping it in tissue and placing in a waste bin. Store any unused condoms in a cool dry place away from direct sunlight.

DE

BENUTZUNGSHINWEISE

1. Überprüfen Sie das auf der Rückseite der Folie aufgedruckte Datum und vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch des Kondoms, dass das angegebene Verfallsdatum noch nicht überschritten ist. Öffnen Sie die Folie von der Seite, um sicherzustellen, dass Sie das Kondom nicht mit Fingernägeln oder Schmuck beschädigen. Wenn die Kondomfolie beschädigt ist, entsorgen Sie das Kondom und verwenden Sie ein neues mit unbeschädigter Verpackung.
2. Wenn Sie ein Gleitmittel verwenden, verwenden Sie nur ein kondomgeeignetes Gleitmittel auf Wasser- oder Silikonbasis wie EXS™ oder Boys Own™. Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Basis von Öl oder Vaseline, da diese das Kondom beschädigen können.
3. Halten Sie das Reservoir zwischen Finger und Daumen und rollen Sie das Kondom vor dem Kontakt mit Ihrem Partner auf den erigierten Penis. Drücken Sie mit Daumen und Finger die Luft aus dem Reservoir, während Sie das Kondom mit der anderen Hand vollständig über den Penis abrollen.
4. Latexkondome sollen Schwangerschaft, HIV / AIDS und andere sexuell übertragbare Infektionen verhindern, beseitigen jedoch das Risiko einer Schwangerschaft und sexuell übertragbarer Krankheiten nicht vollständig. Latexkondome sind am wirksamsten gegen sexuell übertragbare Krankheiten wie HIV-Infektionen (AIDS) und Gonorrhoe, die durch Kontakt der Geschlechtsorgane übertragen werden. Latexkondome sind weniger wirksam gegen sexuell übertragbare Krankheiten wie humanes Papillomavirus (HPV) und Herpes. Diese Infektionen können auch durch Kontakt mit infizierter Haut verbreitet werden, die nicht vom Kondom bedeckt ist. Latexkondome verringern das Risiko der Übertragung von sexuell übertragbaren Krankheiten, indem sie eine Barriere gegen die Infektionsquelle bilden. Wenn Sie glauben, sich infiziert zu haben, wenden Sie sich an einen Arzt. Latexkondome sollen bei der Vorbeugung von sexuell übertragbaren Infektionen und Schwangerschaft helfen. Weitere Informationen zu Latexkondomen oder sexuell übertragbaren Krankheiten erhalten Sie von einem Gesundheitsdienstleister oder einer öffentlichen Gesundheitsbehörde.
5. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Kondom abrutscht oder zu fest sitzt, ziehen Sie den Penis zurück und überprüfen Sie, ob das Kondom vorhanden und unbeschädigt ist. Wenn sich das Kondom bewegt hat, rollen Sie es zurück oder verwenden Sie ein anderes Kondom, wenn Sie befürchten, dass das Kondom beschädigt sein könnte. Verwenden Sie das Kondom nicht, wenn sich das Material klebrig anfühlt, oder spröde oder offensichtlich beschädigt ist. Auch wenn die Färbung ungleichmäßig ist oder sich ändert, verwenden Sie das Kondom nicht. Kondome bestehen aus Naturkautschuklatex, der allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen kann, wenn der Benutzer allergisch auf Latex reagiert.
6. Ziehen Sie nach der Ejakulation den Penis heraus, während Sie das Kondom mit der Hand am unteren Ende festhalten, um sicherzustellen, dass es nicht abrutscht. Wenn der Penis komplett herausgezogen ist, können Sie das Kondom abstreifen.
7. Wenn Sie befürchten, dass das Kondom beim Sex beschädigt wurde, suchen Sie vorzugsweise innerhalb von 24 Stunden, spätestens jedoch nach 72 Stunden, einen Arzt oder Berater für sexuelle Gesundheitsfürsorge auf. Wenn die Kondomfolie beschädigt ist, entsorgen Sie das Kondom und wählen Sie ein anderes Kondom aus der Packung. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker nach der Verträglichkeit von topischen Arzneimitteln, die mit dem Kondom in Kontakt kommen könnten.
8. Verwenden Sie jedes Kondom nur einmal. Die Wiederverwendung eines Kondoms kann das Risiko von Materialversagen, Abrutschen und Übertragung sexuell übertragbarer Infektionen einschließlich HIV erhöhen. Entsorgen Sie das Kondom, indem Sie es in ein Taschentuch einwickeln und in einen Abfallbehälter geben. Bewahren Sie nicht verwendete Kondome an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

PT

INSTRUÇÕES PARA O USO DE PRESERVATIVOS

1. Verifique a data na embalagem do preservativo para garantir que o prazo de validade está dentro do prazo de validade, geralmente impresso no verso da embalagem. Rasgue ao longo de um lado da folha do preservativo, certificando-se de não danificá-lo com as unhas ou joias. Se a folha do preservativo estiver danificada, descarte o preservativo e use um novo de uma embalagem não danificada.
2. Se você estiver usando um lubrificante, use apenas um lubrificante à base de água, como EXS TM ou Boys Own TM, não use lubrificantes à base de óleo, como vaselina, pois podem danificar o preservativo.
3. Segure a tetina do preservativo entre o dedo e o polegar e role o preservativo sobre o pênis ereto antes de entrar em contato com o seu parceiro. Desenrole todo o comprimento do pênis, expelindo todo o ar do preservativo.
4. Os preservativos de látex têm como objetivo prevenir a gravidez, HIV / AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, mas não eliminam completamente os riscos de gravidez e DSTs. Os preservativos de látex são mais eficazes contra as DSTs, como a infecção pelo HIV (AIDS) e a gonorréia, que se propagam pelo contato com a cabeça do pênis. Os preservativos de látex são menos eficazes contra as ISTs, como o papilomavírus humano (HPV) e o herpes. Essas DSTs também podem ser transmitidas pelo contato com a pele infectada que não está coberta pelo preservativo. Preservativos de látex reduzem o risco de transmissão de DSTs, fornecendo uma barreira contra a fonte da infecção. Se você acredita que tem uma DST, entre em contato com um profissional de saúde. Preservativos de látex são para auxiliar na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e gravidez. Para obter mais informações sobre preservativos de látex ou DSTs, entre em contato com um profissional de saúde ou agência de saúde pública.
5. Se você sentir que o preservativo está escorregando ou apertando excessivamente, retire o pênis de seu parceiro e verifique se o preservativo está no lugar e não danificado. Se o preservativo tiver se movido, role-o de volta no lugar ou use outro preservativo se você estiver preocupado com a possibilidade de danos ao preservativo. Se o material de borracha estiver pegajoso, quebradiço ou obviamente danificado, não use o preservativo. Se a cor estiver irregular ou alterada, não use o preservativo. Os preservativos são feitos de látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas, incluindo choque anafilático, se o usuário for alérgico ao látex.
6. Após a ejaculação retire o pênis de seu parceiro segurando a base do preservativo e certifique-se de que ele não escorregue. Quando o pênis é retirado de seu parceiro, você pode remover o preservativo.
7. Se você está preocupado com o fato de que o preservativo foi danificado durante o sexo, procure assistência médica, como um médico ou consultor de saúde sexual, de preferência dentro de 24 horas, mas não após 72 horas. Se a folha do preservativo estiver danificada, descarte o preservativo e escolha outro da embalagem. Consulte um médico ou farmacêutico sobre a compatibilidade dos medicamentos tópicos que podem entrar em contato com o preservativo.
8. Use preservativo apenas uma vez. A reutilização de um preservativo pode aumentar o risco de rompimento, escorregamento e transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV. Elimine o preservativo embrulhando-o em lenço de papel e colocando-o no caixote do lixo. Guarde os preservativos não usados em um local fresco e seco, longe da luz solar direta.

ES

INSTRUCCIONES DE USO DEL PRESERVATIVO

1. Verifique la fecha en la lámina del condón para asegurarse de que el condón esté dentro de la fecha de caducidad generalmente impresa en la parte posterior de la lámina. Rasgue un lado de la lámina del condón asegurándose de no dañar el condón con las uñas o las joyas. Si la lámina del condón está dañada, deseche ese condón y use uno nuevo de un paquete que no esté dañado.
2. Si está usando un lubricante, use solamente un lubricante a base de agua como EXS TM o Boys Own TM, no use lubricantes a base de aceite como vaselina, ya que pueden dañar el condón.
3. Sostenga la tetina del condón entre el dedo y el pulgar y enrolle el condón sobre un pene erecto antes de entrar en contacto con su pareja. Desenrolle todo el pene para expulsar el aire del condón.
4. Los condones de látex están destinados a prevenir el embarazo, el VIH / SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, pero no eliminan por completo los riesgos de embarazo e ITS. Los condones de látex son más eficaces contra las ITS, como la infección por VIH (SIDA) y la gonorrea, que se transmiten por contacto con la cabeza del pene. Los condones de látex son menos efectivos contra las ITS como el virus del papiloma humano (VPH) y el herpes. Estas ITS también se pueden transmitir por contacto con piel infectada que no está cubierta por el condón. Los condones de látex reducen el riesgo de transmitir ITS al proporcionar una barrera contra la fuente de la infección. Si cree que tiene una ITS, comuníquese con un proveedor de atención médica. Los condones de látex sirven para prevenir las infecciones de transmisión sexual y el embarazo. Para obtener más información sobre los condones de látex o las ITS, comuníquese con un proveedor de atención médica o una agencia de salud pública.
5. Si siente que el condón se desliza o se aprieta excesivamente, retire el pene de su pareja y verifique que el condón esté en su lugar y que no esté dañado. Si el condón se ha movido, vuelva a colocarlo en su lugar o use otro condón si le preocupa que se dañe. Si el material de goma es pegajoso o quebradizo o está evidentemente dañado, no use el condón. Si el color es desigual o cambia, no use el condón. Los condones están hechos de látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas, incluido un shock anafiláctico, si el usuario es alérgico al látex.
6. Después de la eyaculación, retire el pene de su pareja sosteniendo la base del condón y asegúrese de que no se resbale. Cuando le quiten el pene a su pareja, puede quitarse el condón.
7. Si le preocupa que el condón se haya dañado durante las relaciones sexuales, busque asistencia médica, como un médico o un asesor de salud sexual, preferiblemente dentro de las 24 horas, pero no más tarde de las 72 horas. Si la lámina del condón está dañada, deseche ese condón y elija otro condón del paquete. Consulte a un médico o farmacéutico acerca de la compatibilidad de los medicamentos tópicos que pueden entrar en contacto con el condón.
8. Use un condón solo una vez. La reutilización de un condón puede aumentar el riesgo de rotura, deslizamiento y transmisión de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Deseche el condón envolviéndolo en un pañuelo y colocándolo en un cubo de basura. Guarde los condones sin usar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

NL

INSTRUCTIES VOOR CONDOOMGEBRUIK

1. Controleer de datum op de condoomfolie om er zeker van te zijn dat het condoom binnen de houdbaarheidsdatum valt die op de achterkant van de folie staat vermeld. Scheur langs een kant van de condoomfolie en zorg ervoor dat u het condoom niet beschadigt met vingernagels of sieraden. Als de condoomfolie beschadigd is, gooi dat condoom weg en gebruik een nieuwe uit een onbeschadigde verpakking.
2. Als je een glijmiddel gebruikt, gebruik dan alleen glijmiddel op waterbasis zoals EXS tm of Boys Own TM gebruik geen glijmiddel op oliebasis zoals vaseline omdat deze het condoom kunnen beschadigen.
3. Houd de condoom tuit tussen uw vinger en duim en rol het condoom om de stijve penis voordat u contact met uw partner maakt. Rol het condoom uit over de volledige lengte van de penis en druk alle lucht uit het condoom.
4. Latexcondooms zijn bedoeld om zwangerschap, hiv / aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen, maar elimineren de risico's van zwangerschap en soa's nooit volledig. Latexcondooms zijn het meest effectief tegen soa's zoals een hiv-infectie (aids) en gonorroe die worden verspreid door contact met de eikel. Latexcondooms zijn minder effectief tegen soa's zoals het humaan papillomavirus (HPV) en herpes. Deze soa's kunnen ook worden verspreid door contact met een geïnfecteerde huid die niet door het condoom wordt bedekt. Latex condooms verminderen het risico op de overdracht van soa's door een barrière te vormen tegen de bron van de infectie. Als je denkt dat je een soa hebt, neem dan contact op met een zorgverlener. Latex condooms helpen bij het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen en zwangerschap. Neem voor meer informatie over latexcondooms of soa's contact op met een zorgverlener of een openbare gezondheidsdienst.
5. Als u voelt dat het condoom af glijdt of te strak zit, trek dan de penis terug en controleer of het condoom op zijn plaats zit en niet beschadigd is. Als het condoom is verplaatst, rol het dan weer op zijn plaats of gebruik een ander condoom als u zich zorgen maakt over het beschadigen van het condoom. Gebruik het condoom niet als het rubberen materiaal plakkerig of broos is of duidelijk beschadigd is. Gebruik het condoom niet als de kleur ongelijk is of is veranderd. Condooms zijn gemaakt van natuurlijk rubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken, waaronder anafylactische shock als de gebruiker allergisch is voor latex.
6. Trek na de ejaculatie de penis van uw partner terug terwijl u de basis van het condoom vasthoudt, zodat deze niet wegglijdt. Hierna kunt u het condoom verwijderen.
7. Als u zich zorgen maakt dat het condoom is beschadigd tijdens de seks, zoek dan medische hulp, zoals een arts of seksueel adviseur, bij voorkeur binnen 24 uur, maar niet later dan 72 uur. Als de condoomfolie beschadigd is, gooi dat condoom dan weg en kies een ander condoom uit de verpakking. Raadpleeg een arts of apotheker over de compatibiliteit van actuele geneesmiddelen die in contact kunnen komen of een effect kunnen hebben op het condoom.
8. Gebruik een condoom maar één keer. Hergebruik van een condoom kan het risico op breuk, uitglijden of de overdracht van seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder HIV, vergroten. Gooi het condoom weg door het in een tissue te wikkelen en in een afvalbak te doen. Bewaar ongebruikte condooms op een koele, droge plaats, en uit de buurt van direct zonlicht.

AR

تعليمات استعمال الواقي

1. تحقق من التاريخ الموجود على ورق الواقي الذكري للتأكد من أن الواقي الذكري ضمن تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع عادة على جانب الرقاقة. قم بتمزيق جانب واحد من ورق الواقي الذكري مع التأكد من عدم إتلاف الواقي الذكري بأظافر الأصابع أو المجوهرات. إذا كانت حالة غلاف الواقي الذكري تالفة، تخلص من ذلك الواقي واستخدم واقيًا جديدًا من علبة غير تالفة.

2. إذا كنت تستخدم مادة تشحيم، فاستخدم فقط مادة تشحيم مائية مثل EXS TM أو Boys Own TM ولا تستخدم مواد التشحيم التي أساسها الزيت مثل الفازلين لأنها قد تلحق الضرر بالواقي الذكري.

3. أمسك حلمة الواقي الذكري بين إصبعك وإبهامك ولف الواقي الذكري على القضيب المنتصب قبل الاتصال بشريكك. قم بفرد طول القضيب بالكامل لطرد أي هواء من الواقي الذكري.

4. تهدف الواقيات الذكرية المصنوعة من اللاتكس إلى منع الحمل، وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والأمراض المنقولة جنسيًا الأخرى، ولكنها لا تقضي تمامًا على مخاطر الحمل والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. الواقيات الذكرية المصنوعة من اللاتكس أكثر فاعلية ضد الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي مثل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والسيلان التي تنتشر عن طريق ملامسة رأس القضيب. الواقيات الذكرية المصنوعة من اللاتكس أقل فعالية ضد الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي مثل فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) والهربس. يمكن أيضًا أن تنتشر هذه الأمراض المنقولة عن طريق ملامسة الجلد المصاب غير المغطى بالواقي الذكري. تقلل الواقيات الذكرية المصنوعة من اللاتكس من خطر نقل الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي من خلال توفير حاجز ضد مصدر العدوى. إذا كنت تعتقد أنك مصاب بعدوى منقولة عن طريق الاتصال الجنسي، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية. الواقي الذكري المصنوع من اللاتكس يساعد في الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً والحمل. لمزيد من المعلومات حول الواقي الذكري أو الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، اتصل بمقدم الرعاية الصحية أو الوكالة الصحة العامة.

5. إذا شعرت أن الواقي الذكري ينزلق أو يشتد بشكل مفرط، فقم بسحب القضيب من شريكك وتأكد من أن الواقي في مكانه وغير تالف. إذا تحرك الواقي فقم بإعادته إلى مكانه أو استخدم واقيًا آخر إذا كنت قلقًا بشأن تلف الواقي الذكري. إذا كانت المادة المطاطية لزجة أو هشة أو تالفة بشكل واضح، فلا تستخدم الواقي الذكري. إذا كان اللون غير متساو أو متغير، فلا تستخدم الواقي الذكري. الواقي الذكري مصنوع من المطاط الطبيعي الذي قد يسبب الحساسية بما في ذلك صدمة الحساسية إذا كان المستخدم لديه حساسية من مادة اللاتكس.

6. بعد القذف، اسحب القضيب من شريكك مع حمل قاعدة الواقي الذكري للتأكد من عدم انزلاقه. عندما يتم سحب القضيب من شريكك، يمكنك بعد ذلك إزالة الواقي الذكري.

7. إذا كنت قلقًا من تعرض الواقي الذكري للتلف أثناء ممارسة الجنس، فاطلب المساعدة الطبية مثل الطبيب أو مستشار الرعاية الصحية الجنسية ويفضل خلال 24 ساعة، ولكن ليس بعد 72 ساعة. إذا كان غلاف الواقي الذكري تالفًا، تخلص من هذا الواقي واختر واقيًا آخر من العبوة. استشر طبيبًا أو صيدليًا حول توافق الأدوية الموضعية التي قد تتلامس مع الواقي الذكري.

8. استخدم الواقي الذكري مرة واحدة فقط. قد يؤدي إعادة استخدام الواقي الذكري إلى زيادة خطر الانكسار، والانزلاق، وانتقال الأمراض المنقولة جنسيا بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية. تخلص من الواقي الذكري عن طريق لفه في منديل ووضعه في سلة المهملات. قم بتخزين أي واقي ذكري غير مستخدم في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.