126mm

42mm

42mm

42mm

INSTRUCTIONS FOR CONDOM USE

LTC HEALTHCARE

LTC Healthcare Customer Care Telephone Number: 00 44 (0) 1423 326687

Distributor: Leeds Trading Company Ltd T/A LTC Healthcare, Boroughbridge, YO51 9BL, United Kingdom.

E: Sales@Ltchealthcare.co.uk www.ltchealthcare.co.uk

@exscondomsofficial @exscondoms

EC REP rit Vertrieb und Service GmbH. Heinrich Kummel Str.3, D-30169 Hannover, Germany.

Richter Rubber Technology Sdn. Bhd.. Plot 209, Kuala Ketil Industrial Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia.

ISO 4074 1639

Read the Instructions for use

Przeczytaj instrukcje użytkowania
Lås bruksanvisningen
Lea las instrucciones de uso
Lees de gebruiksaanwijzing
Lesen Sie die Gebrauchsanweisungt
Přečtěte si návod k použití
Leggi le istruzioni per l'uso
Les bruksanvisningen
Læs brugsanvisningen
Lire les instructions d'utilisation
Leia as instruções de uso
يرجى قراءة تعليمات الاستخدام
Luege kasutusjuhendit
Lugege kasutusjuhendit

Not to Be used If Package is damaged

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
Får inte användas om förpackningen är skadad
No debe usarse si el paquete está dañado
Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
Nepoužívat, pokud je obal poškozen
Da non utilizzare se la confezione è danneggiata
Ma ikke brukes hvis pakken er skadet
Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
Não deve ser usado se o pacote estiver danificado
لا يجوز الاستخدام إذا كان الغلاف تالفًا
Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud
Nenaudoti, jei pakuotė pažeista

LATEX

Caution this product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions including anaphylactic shock.

Uwaga: Ten produkt zawiera lateks kauczuku naturalnego, który może powodować reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny.

Varning: Denna produkt innehåller naturgummilatex som kan orsaka allergiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock.

Precaución: este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas, incluido el shock anafiláctico.

Let op: Dit product bevat natuurlijke rubberlatex die allergische reacties kan veroorzaken, waaronder anafylactische shock.

Warnung: Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, der allergische Reaktionen bis hin zu anaphylaktischem Schock auslösen

Upozornění: Tento produkt obsahuje přírodní latex, který může způsobit alergické reakce včetně anafylaktického šoku.

Avvertenza: questo prodotto contiene lattice naturale, che può causare reazioni allergiche incluso shock anafilattico.

Forsiktig: Dette produktet inneholder naturgummilateks som kan forårsake allergiske reaksjoner inkludert anafylaktisk sjokk.

Forsigtig: Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner, herunder anafylaktisk shock.

Attention : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques, notamment un choc

Atenção este produto contém látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas incluindo choque anafilático

Ettevaatust: see toode sisaldab looduslikku kummilateksit, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone, sealhulgas anafülaktilist šokki.

Įspėjimas: Šiame gaminyje yra natūralaus latekso, kuris gali sukelti alergines reakcijas, įskaitant anafilaksinį šoką.

كابح يؤدي إلى حساسية بما في ذلك الصدمة التأقية

Do not expose to sunlight

Utsätt inte för solljus
No exponer a la luz solar
Niet blootstellen aan zonlicht
Nicht dem Sonnenlicht aussetzen
Nevystavujte slunečnímu záření
Nie wystawiać na działania promieni słonecznych
Non esponete alla luce solare
Ikke utsettes for sollys
Må ikke udsættes for sollys
Ne pas exposer au soleil
Não exponha à luz solar
لا تعرض للضوء الشمس
Ärge jätke päikesevalgusele kätte
Neleisk kytės saulės spindulių

Keep Dry

Utrzymuj produkt w suchości!
Håll produkten torr
Mantenga el producto seco
Houd het product droog
Produkt trocken halten
Udržujte výrobek v suchu
Mantieni il prodotto asciutto
Hold produktet tørt
Garde le produit au sec
Mantenha o produto seco
أبقي منتجك جافًا
Hoida kuivas
Laikykite produktą sausą

Storage Temperature

30°C / 5°C

Temperatura przechowywania
Förvaringstemperatur
Temperatura de almacenamiento
Bewaar temperatuurt
Lagertemperatur
Skladovací teplota
Temperatura di conservazione
Lager temperatur
Lager temperatur
Temperature de stockage
Temperatura de armazenamento
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Säilitustemperatuur
Laikymo temperatūra

Use Once

Używaj raz
Använd en gång
Usar una vez
Een keer gebruiken
Einmal verwenden
Použijte jednou
Utilizzare una volta
Bruk en gang!
Brug én gang
Utiliser une fois
Uzar uma vez
استخدم مرة واحدة فقط
Kasutage üks kord
Naudokite vieną kartą

Revision No. EXS/05.08.2022

DK

BRUGSANVISNING

1. Kontrollerdatoenpåkondomfolien for at sikre, at kondometerinden for den udløbsdato, der normalertrykpåbagsidenaf folien. Rivlangs den ene side afkondomfolien, ogsørg for, at du ikkebeskadigerkondomet med fingernegleellersmykker. Hviskondomfolienerbeskadiget, skal du kasseredetogbrugenenmyfraenuskadetpakke.
2. Hvis du brugeretsmøremiddel, skal du kun bruge et vandbaseretsmøremiddel- som EXS TM eller Boys Own TM, må du ikkebrugeoliebaseredesmøremidler- somvaseline, da dissekanbeskadigekondomet.
3. Hold kondomspenennellemfingerenogtommelfingeren, ogrullokondometpåanoprejst penis indenkontakt med din partner. Rulned den fuldelængdeaf penis, der uddriverluftfrakondomet.
4. Latexkondomererberegnettil at forhindregravidtet, hiv / aids ogandenseksuelttoverførtinfektion, men elimererikkefuldstændigtrisikoen for graviditetogkønssygdomme. Latexkondomerermesteffektive mod kønssygdommesom HIV-infektion (AIDS) oggonorå, der spredesvedkontakt med penishovedet. Latexkondomerermindreeffektive mod STI'ersåsomhumant papillomavirus (HPV) og herpes. DisseSTI'erkanogsåspredesvedkontakt med inficerethud, der ikkeerdækketafkondomet. Latexkondomerreducererrisikoen for overførselafSTI'erved at give embarriere med infektionskilden. Hvis du mener, at du haren STI, skal du kontaktensundhedsudbyder. Latex kondomer bidrager til prevention mod graviditet og seksuelt overførte sygdomme. For mere information omlatexkondomerellerSTI'er, kontaktensundhedsudbyderel- ler et fokusundhedsagentur.
5. Hvis du falder, at kondomet glider udellerstrammer for meget, skal du trække penis udaf din partner ogkontrollere, at kondometerpåpladsogikkeerbeskadi- get. Hviskondometerflyttet, skal du ralledetpåpladsigenellerbrugeetandetkon- dom, hvis du erbekymret for, at kondometbliverbeskadiget. Brugikkekondomet, hvisgummimaterialeterklæbrigt, skørtellerråbenbartbeska- diget. Brugikkekondomet, hvisfarvenerujævnellerændret. Kondomer er lavet af naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner, herunder anafylaktisk shock, hvis brugeren er allergisk over for latex.
6. Efterudlæsningtrækker du penis fra din partner, der holder kondombunden, for at sikre, at den ikke glider af. Når penis trækkesudaf din partner, kan du dereffterfjernekondomet.
7. Hvis du erbekymret for, at kondometerblevetbeskadiget under sex, skal du søgelægehjælp, såsomenlægeellerenseksuelsundhedsrådgiver, helstinden for 24 timer, men ikkesenere end 72 timer. Hviskondomfolienerbeskadiget, skal du kasserekondometogvælge et andetkondomfrapakken. Kontaktenlægeellerapotekomkompatibiliteten mellan aktuelllægemidler, der kankommemikontakt med kondomet.
8. Brugkunkondomen gang. Genbrugefkondomkanagerisikoen for brud, glidning, transmission afseksuelttoverførteinfektionerinkluive HIV. Bortskafkondometved at indpakkedetilvaveogplacerededtenaffaldsspand. Opbevarubrugtekondomerpåetkøligt, tørtstedvækfradirektesollys.

SE

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV KONDOM

1. Kontrollera datumet på kondomfolien för att säkerställa att kondomen ligger inom det utgångsdatum som vanligtvis skrivs ut på baksidan av folien. Riv längs ena sidan av kondomfolien och se till att du inte skadar kondomen med naglar eller smycken. Om kondomfolien är skadad kasserar du kondomen och använder en ny från ett oskadat förpackning.
2. Om du använder ett smörjmedel, använd endast ett vattenbaserat glidmedel som EXS TM eller Boys Own TM, använd inte oljebaserade smörjmedel som vaselin eftersom det kan skada kondomen.
3. Håll kondomspennen mellan fingret och tummen och rulla kondomen mot en upprätt penis innan du kommer i kontakt med din partner. Rulla ner hela penisens längd som driver ut luft från kondomen.
4. Latexkondomer är avsedda att förhindra graviditet, hiv / aids och annan sexuellt överförbar infektion men eliminerar inte helt riskerna för graviditet och STI. Latexkondomer är mest effektiva mot könssjukdomar som HIV-infektion (AIDS) och gonorré som sprids genom kontakt med penishuvudet. Latexkondomer är mindre effektiva mot STI som humant papillomvirus (HPV) och herpes. Dessa STI kan också spridas genom kontakt med infekterad hud som inte täcks av kondomen. Latexkondomer minskar risken för överföring av STI genom att tillhandahålla en barriär mot infektionskällan. Om du tror att du har en STI, kontakta en vårdgivare. Latexkondomer hjälper till att förhindra sexuellt överförbara infektioner och graviditet. För mer information om latexkondomer eller STI, kontaktas en vårdgivare eller en folkhälsobyrå.
5. Om du känner att kondomen glider av, eller stramar för hårt, dra sedan ut penis från din partner och kontrollera att kondomen är på plats och inte skadad. Om kondomen har flyttat runt eller till botten den på plats eller använder en annan kondom om du är orolig för att kondomen skadas. Använd inte kondomen om gummimaterialet är klibbigt, sprött eller uppenbart skadat. Använd inte kondomen om färgen är ojämn eller förändrad. Kondomer är gjorda av naturgummilatex som kan orsaka allergiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock om användaren är allergisk mot latex.
6. Efter utlösning dra ut penis från din partner som håller kondomens botten så att den inte glider av. När penis dras ut från din partner kan du sedan ta bort kondomen.
7. Om du är orolig att kondomen har skadats under sex, sök då medicinsk hjälp, t.ex. en läkare eller sexuell vårdgivare, helst inom 24 timmar, men inte senare än 72 timmar. Om kondomfolien är skadad kasserar du kondom och väljer en annan kondom ur förpackningen. Rådgör med en läkare eller apotekspersonal om kompatibiliteten mellan aktuella läkemedel som kan komma i kontakt med kondomen.
8. Använd endast kondom en gång. Återanvändning av kondom kan öka risken för brott, glidning, överföring av sexuellt överförbara infektioner inklusive hiv. Kassera kondomen genom att förpacka den i vävnad och placera den i en soptunna. Förvara oanvända kondomer på en sval, torr plats och inte i direkt solljus.

CZ

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ KONDOMŮ

1. Zkontrolujte datum na fólii kondomu, abyste se ujistili, že je kondom v době použitelnosti, která je obvykle vytištěna na zadní straně fólie, Roztrhněte jednu stranu fólie kondomu, abyste nepoškodili kondom nehty nebo šperky. Pokud je fólie na kondomu poškozena, zlikvidujte tento kondom a použijte nový z nepoškozeného balení.
2. Pokud používáte lubrikant, používejte pouze lubrikační gely na vodní bázi, jako je EXS TM nebo Boys Own TM, nepoužívejte lubrikanty na bázi oleje, jako je vazelína, protože by mohly poškodit kondom.
3. Držte rezervoár kondomu mezi prstem a palcem a před stykem s partnerem nasaďte kondom na vztyčený penis. Rozviňte dolů po celé délce penisu a vytlačte z kondomu veškerý vzduch.
4. Latexové kondomy jsou určeny k prevenci otěhotnění, HIV / AIDS a jiných pohlavně přenosných infekcí, ale ne úplně eliminují rizika těhotenství a pohlavně přenosných chorob, Latexové kondomy jsou nejúčinnější proti pohlavně přenosným chorobám, jako je infekce HIV (AIDS) a kapavka, které se šíří kontaktem s hlavou penisu. Latexové kondomy jsou méně účinné proti pohlavně přenosným chorobám, jako je lidský papillomavirus (HPV) a opar, Tyto pohlavně přenosné choroby lze šířit také kontaktem s infikovanou kůží, která není pokryta kondomem. Latexové kondomy snižují riziko přenosu pohlavně přenosných chorob poskytnutím bariéry proti zdroji infekce, Pokud si myslíte, že máte pohlavně přenosnou chorobu, obraťte se na poskytovatele zdravotní péče. Latexové kondomy mají pomáhat při prevenci pohlavně přenosných infekcí a těhotenství, Další informace o latexových kondomech nebo pohlavně přenosných chorobách získáte od poskytovatele zdravotní péče nebo od agentury veřejného zdraví.
5. Pokud máte pocit, že kondom skloužává nebo se příliš stahuje, vytáhněte penis z partnera/ky a zkontrolujte, zda je kondom na svém místě a není poškozený. Pokud se kondom pohnul, vraťte jej zpět na místo nebo použijte jiný kondom, pokud máte obavy z poškození kondomu, Pokud je gumový materiál lepkavý, křehký nebo zjevně poškozený, kondom nepoužívejte. Pokud je barva nerovnoměrná nebo změněná, kondom nepoužívejte. Kondomy jsou vyrobeny z přírodního kaučukového latexu, který může způsobit alergické reakce včetně anafylaktického šoku, pokud je uživatel alergický na latex.
6. Po ejakulaci vytáhněte penis z partnera/ky a držte spodní část kondomu. Zajistěte, aby nekloužal, Když je penis ven z vašeho partnera/ky, můžete kondom odstranit.
7. Pokud máte obavy, že byl kondom během sexu poškozen, vyhledejte lékařskou pomoc, například lékaře nebo poradce v oblasti sexuálního zdraví, nejlépe do 24 hodin, nejpozději však do 72 hodin. Pokud je kondomová fólie poškozená, zlikvidujte tento kondom a vyberte z balení jiný kondom, Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem o kompatibilitě topických léků, které by mohly přijít do styku s kondomem.
8. Kondom používejte pouze jednou. Opakované použití kondomu může zvýšit riziko roztržení, zklouznutí nebo přenosu sexuálně přenosných infekcí, včetně HIV. Kondom zlikvidujte zabalením do kapesníku a umístěním do odpadkového koše. Nepoužité kondomy skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo.

UK

INSTRUCTIONS FOR CONDOM USE

1. Check the date on the condom foil to ensure the condom is within the expiry date usually printed on the back of the foil. Tear along one side of the condom foil making sure you do not damage the condom with finger nails or jewellery. If the condom foil is damaged discard that condom and use a new one from an undamaged pack.
2. If you are using a lubricant only use a water based lubricant such as EXS™ or Boys Own™ do not use oil based lubricants such as petroleum jelly as these may damage the condom.
3. Hold the condom teat between your finger and thumb and roll the condom onto an erect penis before contact with your partner, Unroll down the full length of the penis expelling any air from the condom.
4. Latex condoms are intended to prevent pregnancy, HIV/AIDS, and other sexually transmitted infection but do not completely eliminate the risks of pregnancy and STIs. Latex condoms are most effective against STIs such as HIV infection (AIDS) and gonorrhea that are spread by contact with the head of the penis, Latex condoms are less effective against STIs such as Human Papillomavirus (HPV) and herpes. These STIs can also be spread by contact with infected skin that is not covered by the condom. Latex condoms reduce the risk of transmitting STIs by providing a barrier against the source of the infection. If you believe you have an STI, contact a health care provider. Latex condoms are to assist in prevention of sexually transmitted infections and pregnancy. For more information on latex condoms or STIs, contact a health care provider or a public health agency.
5. If you feel the condom is slipping off, or is tightening excessively then withdraw the penis from your partner and check the condom is in place and not damaged, If the condom has moved then roll it back in place or use another condom if you are concerned about the condom being damaged. If the rubber material is sticky or brittle or obviously damaged, do not use the condom, If the colour is uneven or changed, do not use the condom. Condoms are made of natural rubber latex which may cause allergic reactions including anaphylactic shock if the user allergic to latex.
6. After ejaculation withdraw the penis from your partner holding the base of the condom to ensure it does not slip off. When the penis is withdrawn from your partner you can then remove the condom.
7. If you are concerned the condom has been damaged during sex then seek medical assistance such as a Doctor or Sexual Healthcare advisor preferably within 24 hours, but not later than 72 hours. If the condom foil is damaged discard that condom and choose another condom from the pack. Consult a doctor or pharmacist about the compatibility of topical medicines that might come in contact with the condom.
8. Use a condom only once. Re-use of a condom may increase the risk of breakage, slippage, transmission of sexually transmitted infections including HIV. Dispose of the condom by wrapping it in tissue and placing in a waste bin. Store any unused condoms in a cool dry place away from direct sunlight.

DE

BENUTZUNGSHINWEISE

1. Überprüfen Sie das auf der Rückseite der Folie aufgedruckte Datum und vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch des Kondoms, dass das angegebene Verfallsdatum noch nicht überschritten ist, Öffnen Sie die Folie von der Seite, um sicherzustellen, dass Sie das Kondom nicht mit Fingernägeln oder Schmuck beschädigen, Wenn die Kondomfolie beschädigt ist, entsorgen Sie das Kondom und verwenden Sie ein neues mit unbeschädigter Verpackung.
2. Wenn Sie ein Gleitmittel verwenden, verwenden Sie nur ein kondomgeeignetes Gleitmittel auf Wasser- oder Silikonbasis wie EXS™ oder Boys Own™, Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Basis von Öl oder Vaseline, da diese das Kondom beschädigen können.
3. Halten Sie das Reservoir zwischen Finger und Daumen und rollen Sie das Kondom vor dem Kontakt mit Ihrem Partner auf den erigierten Penis, Drücken Sie mit Daumen und Finger die Luft aus dem Reservoir, während Sie das Kondom mit der anderen Hand vollständig über den Penis abrollen.
4. Latexkondome sollen Schwangerschaft, HIV / AIDS und andere sexuell übertragbare Infektionen verhindern, beseitigen jedoch das Risiko einer Schwangerschaft und sexuell übertragbarer Krankheiten nicht vollständig, Latexkondome sind am wirksamsten gegen sexuell übertragbare Krankheiten wie HIV-Infektionen (AIDS) und Gonorrhoe, die durch Kontakt der Geschlechtsorgane übertragen werden, Latexkondome sind weniger wirksam gegen sexuell übertragbare Krankheiten wie humanes Papillomavirus (HPV) und Herpes, Diese Infektionen können auch durch Kontakt mit infizierter Haut verbreitet werden, die nicht vom Kondom bedeckt ist, Latexkondome verringern das Risiko der Übertragung von sexuell übertragbaren Krankheiten, indem sie eine Barriere gegen die Infektionsquelle bilden, Wenn Sie glauben, sich infiziert zu haben, wenden Sie sich an einen Arzt, Latexkondome sollen bei der Vorbeugung von sexuell übertragbaren Infektionen und Schwangerschaft helfen, Weitere Informationen zu Latexkondomen oder sexuell übertragbaren Krankheiten erhalten Sie von einem Gesundheitsdienstleister oder einer öffentlichen Gesundheitsbehörde.
5. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Kondom abrutscht oder zu fest sitzt, ziehen Sie den Penis zurück und überprüfen Sie, ob das Kondom vorhanden und unbeschädigt ist, Wenn sich das Kondom bewegt hat, rollen Sie es zurück oder verwenden Sie ein anderes Kondom, wenn Sie befürchten, dass das Kondom beschädigt sein könnte. Verwenden Sie das Kondom nicht, wenn sich das Material klebrig anfühlt, oder spröde oder offensichtlich beschädigt ist, Auch wenn die Färbung ungleichmäßig ist oder sich ändert, verwenden Sie das Kondom nicht, Kondome bestehen aus Naturkautschuklatex, der allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen kann, wenn der Benutzer allergisch auf Latex reagiert.
6. Ziehen Sie nach der Ejakulation den Penis heraus, während Sie das Kondom mit der Hand am unteren Ende festhalten, um sicherzustellen, dass es nicht abrutscht, Wenn der Penis komplett herausgezogen ist, können Sie das Kondom abstreifen.
7. Wenn Sie befürchten, dass das Kondom beim Sex beschädigt wurde, suchen Sie vorzugsweise innerhalb von 24 Stunden, spätestens jedoch nach 72 Stunden, einen Arzt oder Berater für sexuelle Gesundheitsfürsorge auf, Wenn die Kondomfolie beschädigt ist, entsorgen Sie das Kondom und wählen Sie ein anderes Kondom aus der Packung, Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker nach der Verträglichkeit von topischen Arzneimitteln, die mit dem Kondom in Kontakt kommen könnten.
8. Verwenden Sie jedes Kondom nur einmal, Die Wiederverwendung eines Kondoms kann das Risiko von Materialversagen, Abrutschen und Übertragung sexuell übertragbarer Infektionen einschließlich HIV erhöhen, Entsorgen Sie das Kondom, indem Sie es in ein Taschentuch einwickeln und in einen Abfallbehälter geben, Bewahren Sie nicht verwendete Kondome an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

PT

INSTRUÇÕES PARA O USO DE PRESERVATIVOS

1. Verifique a data na embalagem do preservativo para garantir que o prazo de validade está dentro do prazo de validade, geralmente impresso no verso da embalagem, Rasgue ao longo de um lado da folha do preservativo, certificando-se de não danificá-lo com as unhas ou joias. Se a folha do preservativo estiver danificada, descarte o preservativo e use um novo de uma embalagem não danificada.
2. Se você estiver usando um lubrificante, use apenas um lubrificante à base de água, como EXS TM ou Boys Own TM, não use lubrificantes à base de óleo, como vaselina, pois podem danificar o preservativo.
3. Segure a tetina do preservativo entre o dedo e o polegar e role o preservativo sobre o pênis ereto antes de entrar em contato com o seu parceiro, Desenrole todo o comprimento do pênis, expelindo todo o ar do preservativo.
4. Os preservativos de látex têm como objetivo prevenir a gravidez, HIV / AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, mas não eliminam completamente os riscos de gravidez e DSTs. Os preservativos de látex são mais eficazes contra as DSTs, como a infecção pelo HIV (AIDS) e a gonorréia, que se propagam pelo contato com a cabeça do pênis. Os preservativos de látex são menos eficazes contra as DSTs, como o papilomavírus humano (HPV) e o herpes, Essas DSTs também podem ser transmitidas pelo contato com a pele infectada que não está coberta pelo preservativo. Preservativos de látex reduzem o risco de transmissão de DSTs, fornecendo uma barreira contra a fonte da infecção, Se você acredita que tem uma DST, entre em contato com um profissional de saúde, Preservativos de látex são para auxiliar na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e gravidez. Para obter mais informações sobre preservativos de látex ou DSTs, entre em contato com um profissional de saúde ou agência de saúde pública.
5. Se você sentir que o preservativo está escorregando ou apertando excessivamente, retire o pênis de seu parceiro e verifique se o preservativo está no lugar e não danificado, Se o preservativo tiver se movido, role-o de volta no lugar ou use outro preservativo se você estiver preocupado com a possibilidade de danos ao preservativo, Se o material de borracha estiver pegajoso, quebradiço ou obviamente danificado, não use o preservativo, Se a cor estiver irregular ou alterada, não use o preservativo, Os preservativos são feitos de látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas, incluindo choque anafilático, se o usuário for alérgico ao látex.
6. Após a ejaculação retire o pênis de seu parceiro segurando a base do preservativo e certifique-se de que ele não escorregue. Quando o pênis é retirado de seu parceiro, você pode remover o preservativo.
7. Se você está preocupado com o fato de que o preservativo foi danificado durante o sexo, procure assistência médica, como um médico ou consultor de saúde sexual, de preferência dentro de 24 horas, mas não após 72 horas. Se a folha do preservativo estiver danificada, descarte o preservativo e escolha outro da embalagem, Consulte um médico ou farmacêutico sobre a compatibilidade dos medicamentos tópicos que podem entrar em contato com o preservativo.
8. Use preservativo apenas uma vez, A reutilização de um preservativo pode aumentar o risco de rompimento, escorregamento e transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV, Elimine o preservativo embrulhando-o em lenço de papel e colocando-o no caixote do lixo, Guarde os preservativos não usados em um local fresco e seco, longe da luz solar direta.

PL

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYWANIA PREZERWATYW

1. Sprawdź datę na folii prezerwatywy, aby upewnić się, że prezerwatywa mieści się w terminie ważności, który jest zwykle drukowany z tyłu folii, Rozerwij jedną stronę folii prezerwatywy, uważając, aby nie uszkodzić prezerwatywy paznokciami lub biżuterią, Jeśli folia prezerwatywy jest uszkodzona, wyrzuć prezerwatywę i użyj nowej z nieuszkodzonego opakowania.
2. Jeśli używasz lubrykantu, używaj wyłącznie lubrykantu na bazie wody, takiego jak EXS TM lub Boys Own TM, nie używaj smarów na bazie oleju, takich jak wazelina, ponieważ mogą one uszkodzić prezerwatywę.
3. Trzymaj smoczek prezerwatywy między palcem wskazującym a kciukiem i rozwiń prezerwatywę na penisa wewzwodzie przed kontaktem z partnerem, Rozwiń prezerwatywę na całej długości, wypuszczając z niej powietrze.
4. Prezerwatywy lateksowe mają na celu zapobieganie ciąży, HIV / AIDS i innym infekcjom przenoszonym drogą płciową, ale nie eliminują całkowicie ryzyka ciąży i chorób przenoszonych drogą płciową, Prezerwatywy lateksowe są najbardziej skuteczne przeciwko chorobom przenoszonym drogą płciową, takim jak zakażenie wirusem HIV (AIDS) i rzeżączka, które rozprzestrzeniają się przez kontakt z główką prącia, Prezerwatywy lateksowe są mniej skuteczne przeciwko chorobom przenoszonym drogą płciową, takim jak wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) i opryszczka, Te choroby przenoszone drogą płciową mogą również rozprzestrzeniać się przez kontakt z zakażoną skórą, która nie jest zakryta prezerwatywą, Prezerwatywy lateksowe zmniejszają ryzyko przenoszenia chorób przenoszonych drogą płciową, zapewniając barierę przed źródłem infekcji, Jeśli uważasz, że masz chorobę przenoszoną drogą płciową, skontaktuj się z lekarzem, Prezerwatywy lateksowe pomagają w zapobieganiu zakażeniom przenoszonym drogą płciową i ciążom w ciążę, Aby uzyskać więcej informacji na temat prezerwatyw lateksowych lub chorób przenoszonych drogą płciową, skontaktuj się z lekarzem lub agencją zdrowia publicznego.
5. Jeśli czujesz, że prezerwatywa zsuwa się lub nadmiernie zaciska, wyjmij penisa partnerowi i sprawdź, czy prezerwatywa jest na miejscu i czy nie jest uszkodzona, Jeśli prezerwatywa się przesunęła, zwiń ją z powrotem na miejsce lub użyj innej prezerwatywy, jeśli obawiasz się, że prezerwatywa zostanie uszkodzona, Jeśli gumowy materiał jest lepki, kruchy lub w oczywisty sposób uszkodzony, nie używaj prezerwatywy, Jeśli kolor jest nierówny lub zmieniony, nie używaj prezerwatywy, Prezerwatywy są wykonane z naturalnego lateksu, który może powodować reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, jeśli użytkownik jest uczulony na lateks.
6. Po wytrysku wyciągnij penisa z partnera/ki, trzymając podstawę prezerwatywy, aby upewnić się, że się nie zsunie, Kiedy penis zostanie wycofany z twojego partnera, możesz zdjąć prezerwatywę.
7. Jeśli obawiasz się, że prezerwatywa została uszkodzona podczas stosunku płciowego, poszukaj pomocy medycznej, np, Lekarza lub doradcy ds, Zdrowia seksualnego, najlepiej w ciągu 24 godzin, ale nie później niż 72 godziny, Jeśli folia prezerwatywy jest uszkodzona, wyrzuć ją i wybierz inną prezerwatywę z opakowania, Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą w sprawie zgodności miejscowych leków, które mogą wejść w kontakt z prezerwatywą.
8. Używaj prezerwatywy tylko raz, Ponowne użycie prezerwatywy może zwiększyć ryzyko pęknięcia, poślizgnięcia się, przeniesienia zakażeń przenoszonych drogą płciową, w tym HIV, Wyrzuć prezerwatywę, owijając ją w chusteczkę i umieszczając w koszu na śmieci, Nieużywane prezerwatywy przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Uwaga: ten produkt zawiera naturalny lateks, który może powodować reakcje alergiczne

FR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU PRÉSERVATIF

1. Vérifiez la date sur la feuille du préservatif pour vous assurer que le préservatif est dans la date d'expiration habituellement imprimée au dos de la feuille, Déchirez le long d'un côté de la feuille du préservatif en vous assurant de ne pas endommager le préservatif avec des ongles ou des bijoux, Si le film du préservatif est endommagé, jetez-le et utilisez-en un neuf provenant d'un emballage intact.
2. Si vous utilisez un lubrifiant, utilisez uniquement un lubrifiant à base d'eau tel que EXS TM ou Boys Own TM, n'utilisez pas de lubrifiants à base d'huile tels que la vaseline car ils peuvent endommager le préservatif.
3. Tenez la tétine du préservatif entre votre doigt et votre pouce et faites rouler le préservatif sur un pénis en érection avant d'entrer en contact avec votre partenaire, Déroulez sur toute la longueur du pénis en expulsant l'air du préservatif.
4. Les préservatifs en latex sont destinés à prévenir la grossesse, le VIH / SIDA et d'autres infections sexuellement transmissibles, mais n'éliminent pas complètement les risques de grossesse et d'IST, Les préservatifs en latex sont les plus efficaces contre les IST telles que l'infection à VIH (SIDA) et la gonorrhée qui se propagent par contact avec la tête du pénis, Les préservatifs en latex sont moins efficaces contre les IST telles que le virus du papillome humain (VPH) et l'herpès, Ces IST peuvent également se propager par contact avec une peau infectée qui n'est pas couverte par le préservatif, Les préservatifs en latex réduisent le risque de transmission des IST en fournissant une barrière contre la source de l'infection, Si vous pensez avoir une ITS, communiquez avec un fournisseur de soins de santé, Les préservatifs en latex aident à prévenir les infections sexuellement transmissibles et la grossesse. Pour plus d'informations sur les préservatifs en latex ou les IST, contactez un fournisseur de soins de santé ou une agence de santé publique.
5. Si vous sentez que le préservatif glisse ou se serre excessivement, retirez le pénis de votre partenaire et vérifiez que le préservatif est en place et n'est pas endommagé, Si le préservatif a bougé, remettez-le en place ou utilisez un autre préservatif si vous craignez que le préservatif ne soit endommagé, Si le matériau en caoutchouc est collant, cassant ou manifestement endommagé, n'utilisez pas le préservatif, Si la couleur est inégale ou modifiée, n'utilisez pas le préservatif, Les préservatifs sont faits de latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique si l'utilisateur est allergique au latex.
6. Après l'éjaculation, retirez le pénis de votre partenaire en tenant la base du préservatif pour vous assurer qu'il ne glisse pas, Lorsque le pénis est retiré de votre partenaire, vous pouvez alors retirer le préservatif.
7. Si vous pensez que le préservatif a été endommagé pendant les rapports sexuels, demandez une assistance médicale, comme un médecin ou un conseiller en soins de santé sexuelle, de préférence dans les 24 heures, mais au plus tard dans les 72 heures, Si le film du préservatif est endommagé, jetez-le et choisissez un autre préservatif dans l'emballage, Consultez un médecin ou un pharmacien sur la compatibilité des médicaments topiques qui pourraient entrer en contact avec le préservatif.
8. N'utilisez un préservatif qu'une seule fois, La réutilisation d'un préservatif peut augmenter le risque de rupture, de glissement et de transmission d'infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH, Jetez le préservatif en l'enveloppant dans du papier absorbant et en le plaçant dans une poubelle, Conservez les préservatifs inutilisés dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil.

TR

PREZERVATİF KULLANIM TALİMATLARI

1. Prezervatifin geneliliğe folyonun arkasında yazılı olan son kullanma tarihi içinde olduğundan emin olmak için prezervatif folyosu üzerindeki tarihi kontrol edin, Prezervatif folyosunun bir tarafını yırtın ve prezervatife tırnak veya taklı ile zarar vermemeye dikkat edin, Prezervatif folyosu hasar görmüşse, prezervatifi atın ve hasarsız bir paketten yeni bir prezervatif seçin.
2. Bir kayganlaştırıcı kullanıyorsanız, yalnızca EXS TM veya Boys Own TM gibi su bazlı bir kayganlaştırıcı kullanın, vazelin gibi yağ bazlı kayganlaştırıcılar prezervatife zarar verebileceği için kullanmayın.
3. Prezervatif emziği ger ngor ve basparmağınız arasında tutun ve partnerinizle temas etmeden önce prezervatifi sertleşmiş bir penise yuvarlayın, Prezervatifteki havayı dışarı atan penisin tamamını aşağı doğru kaydırın.
4. Lateks prezervatifler hamileliği, HIV / AIDS'i ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları önlemeye yöneliktir, ancak hamilelik ve CYBE risklerini tamamen ortadan kaldırmaz, Lateks prezervatifler, penis başı ile temas yoluyla yayılan HIV enfeksiyonu (AIDS) ve bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı en etkilidir, Lateks prezervatifler, İnsan Papilloma virüsü (HPV) ve herpes gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı daha az etkilidir, Bu CYBE'ler, prezervatifin kapatmadığı enfekte deri ile temas yoluyla da yayılabilir, Lateks prezervatifler, enfeksiyon kaynağına karşı bir bariyer sağlayarak CYBE bulaşma riskini azaltır, Bir STI'niz olduğuna inanıyorsanız, bir sağlık uzmanına başvurun, Lateks prezervatifler cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların ve hamileliğin önlenmesine yardımcı olur, Lateks prezervatifler veya CYBE'ler hakkında daha fazla bilgi için bir sağlık hizmeti sağlayıcısı veya bir halk sağlığı kurumu ile iletişime geçin.
5. Prezervatifin kaydığını veya aşırı derecede sıkıdığını hissederseniz, penisi partnerinizden çıkarın ve prezervatifin yerinde ve hasarlı olmadığını kontrol edin, Prezervatif hareket ettiyse, prezervatifin hasar görmesinden endişe ediyorsanız yerine geri sarın veya başka bir prezervatif kullanın, Kauçuk malzeme yapışkan veya kırılgansa veya bariz bir şekilde hasar görmüşse, prezervatifi kullanmayın, Renk eşit değilse veya değişmişse prezervatif kullanmayın, Prezervatifler, kullanıcının lateksa alerjisi varsa anafilaktik şok dahil alerjik reaksiyonlara neden olabilen doğal kauçuk lateksten yapılmıştır.
6. Boşalmadan sonra penisi, prezervatifin tabanını tutan partnerinizden çerçi çekin ve kaymamasını sağlayın, Penis partnerinizden çekildiğinde prezervatifi de çıkarabilirsiniz.
7. Prezervatifin cinsel ilişki sırasında hasar gördüğünden endişeleniyorsanız, tercihen 24 saat içinde ancak en geç 72 saat içinde bir Dokt